


Hjärt-Lungfonden har från de svenska hjärt-kärlregistren Swedeheart fått en korrigerad tabell när det gäller kärilvidgande behandling. Tabellen i Hjärtrapporten (figur 15, sid 16) missgynnar på grund av brister i rapporteringssystemet de län som använder propplösande behandling (trombolys). Nedanstående tabell ger en mer rättvisande bild.

Den nya tabellen förändrar emellertid inte slutsatsen i rapporten, att det i hela landet dröjer för lång tid till kärilvidgande behandling och att det är stora skillnader mellan landstingen.



Tabellen visar start av reperfusionbehandling inom rekommenderad tid från första EKG. Avser hjärtinfarktspatienter upp till 80 år med ST-höjningsinfarkt. Landstingen får 0,5 poäng om minst 75 procent av patienterna får behandling inom rekommenderad tid (det vill säga tid från första EKG till reperfusionbehandling ska vara högst 30 minuter vid trombolys och högst 90 minuter vid PCI) och 1 poäng om minst 90 procent av patienterna får behandling inom rekommenderad tid. Som synes är det inget landsting som når upp till 1 poäng och endast sju som når 0,5 poäng. I medeltal är det 71 procent av patienterna med ST-höjningsinfarkt som får behandling inom rekommenderad tid.

Källa. Swedeheart: Årsrapport 2010.